消毒薬(塩素系)の作り方

新型コロナウイルスには**消毒用アルコールが有効**ですが、
現在品薄である消毒用アルコールが手元にない場合、
ご家庭用の塩素系漂白剤から新型コロナに有効な消毒薬が作れます。
ただし、**換気を十分に行うことや手指消毒には用いない**など、
塩素系漂白剤（裏面）の注意事項をよくご理解の上、
周囲で感染の疑いがある場合にのみご活用いただくようお願いいたします。

用意するもの

- **市販の塩素系漂白剤※1**
- **500mLのペットボトル※2**
- **水道水**

※1　キッチンハイター、ハイター、ブリーチなど（濃度5～6%）
※1　ミルトンやミルクポンなど赤ちゃん用の塩素系消毒薬は（濃度1%）と薄いため、そのまま食器・哺乳瓶の漬けおき用として使用すること。

※2　大量に作る場合はバケツ等を用意。

塩素系消毒薬（500mL分）の作り方について

①**ペットボトルのキャップ**を使い、ペットボトル内に
　塩素系漂白剤を **キャップ2杯分（10mL）**計量して入れる。
②そこへ**水道水を入れて500mL**とする。
　（濃度が均一になるように、蓋を閉めてから静かに振り混ぜましょう）

※誤飲防止のため、ラベリング必須。その都度作成し、使い切ること。

塩素系消毒薬を大量に作る場合

キッチンハイターの**付属キャップ2杯（50mL）**に対し、
約2．5Lの水で薄める。
（ハイター、ブリーチ等も同様に水で50倍に希釈する）

新型コロナの消毒方法

下記は、ご家族内に感染確定者、
または濃厚接触者（無症状感染者）がいる場合であり、
特に該当しない場合は、必要以上に消毒するのではなく、
普段どおりの洗浄でかまいません。
今回作成した塩素系消毒薬の有効塩素濃度は1,000ppmです。

消毒箇所	処理方法	希釈倍率
手指	塩素系消毒薬は使用できません。 通常の手洗いを励行	塩素系消毒薬は使用できません。
リネン、衣類 食器、箸、スプーン、コップなど	通常の洗濯・洗浄を行います。他の人と分別は不要です。	消毒は必須でない
ドアノブ、手すり、テーブル、日用品、遊具	消毒薬（500ppm）で清拭後、水拭き。（布類・金属部分は変色や腐食に注意）	2倍希釈
トイレ・洗面所	家庭用洗剤で清掃し、すすいだ後、 消毒薬（1,000ppm）で清拭。	そのまま（1倍）
嘔吐・下痢した箇所（床など）	雑巾等で取り除き、 消毒薬（1,000ppm）で清拭後、水拭き。	そのまま（1倍）