

おくすりペーストの作り方(乳児用)

1



小皿にお薬を出して、
水を1～2滴 垂らします。

2



スプーンなどで少しずつ全体
を混ぜ合わせます。さらに、
水を1滴ずつ加えては混ぜ
ていきます。

3



スプーンなどで裏返しても落
ちない程度にドロツとすれば、
おくすりペーストの完成です。

4



清潔な指でペーストをすくい、
ほほの内側 (または上あご)に
塗りつけます。
その後、スポイトなどを使って
水や白湯などで流し込みます。

服用するタイミングについて

- * 1日3回の薬は 4時間以上、
1日2回の薬は 6時間以上 あけて飲ませてください。
- * **食前 (授乳前またはミルク前)** が飲ませやすいです。
(食後ではお腹いっぱい嫌がったり、ゲップとともに吐き出すことがあります)
- * お子さんが起きているときに様子を見ながら、
都合がよいタイミングでお薬をあげてください。

水に溶かして服用する場合

- ① 小さめのカップ内にお薬を水で溶かし、スポイトでお薬を
吸っておきます。
- ② お子さんを **横抱き** にしてスポイトの先端が **頬の内側** を
伝うように、少しずつお薬を口の中に注入してください。

禁止事項・生活上の注意点

- * **主食やミルクに混ぜないでください!**
(味が変わって飲み残したり、主食やミルクが嫌いになるおそれがあります)
- * お薬は手の届かないところに保管しましょう。

おくすりペーストの作り方(乳児用)

1



小皿にお薬を出して、
水を1～2滴 垂らします。

2



スプーンなどで少しずつ全体
を混ぜ合わせます。さらに、
水を1滴ずつ加えては混ぜ
ていきます。

3



スプーンなどで裏返しても落
ちない程度にドロツとすれば、
おくすりペーストの完成です。

4



清潔な指でペーストをすくい、
ほほの内側 (または上あご)に
塗りつけます。
その後、スポイトなどを使って
水や白湯などで流し込みます。

服用するタイミングについて

- * 1日3回の薬は 4時間以上、
1日2回の薬は 6時間以上 あけて飲ませてください。
- * **食前 (授乳前またはミルク前)** が飲ませやすいです。
(食後ではお腹いっぱい嫌がったり、ゲップとともに吐き出すことがあります)
- * お子さんが起きているときに様子を見ながら、
都合がよいタイミングでお薬をあげてください。

水に溶かして服用する場合

- ① 小さめのカップ内にお薬を水で溶かし、スポイトでお薬を
吸っておきます。
- ② お子さんを **横抱き** にしてスポイトの先端が **頬の内側** を
伝うように、少しずつお薬を口の中に注入してください。

禁止事項・生活上の注意点

- * **主食やミルクに混ぜないでください!**
(味が変わって飲み残したり、主食やミルクが嫌いになるおそれがあります)
- * **お薬は手の届かないところに保管しましょう。**